

Total number of pages-20

Subject Code : C2

B16-GM  
EN/AS/BN

2016

## GENERAL MATHEMATICS

Full Marks : 80  
Pass Marks : 24

Time : Three hours

*The figures in the margin indicate full marks for the questions.*

Take  $\pi = \frac{22}{7}$  wherever necessary.

প্রয়োজন অনুসরি  $\pi = \frac{22}{7}$  লাগ।

প্রয়োজন অনুসারে  $\pi = \frac{22}{7}$  নেলো।

Contd.

## SECTION-A

*Question numbers 1 to 12 carry 1 mark each.*

প্রশ্ন নম্বর 1 থেকে 12 লৈ প্রত্যেকটিতে মূল্যাংক 1

প্রশ্ন নম্বর 1 থেকে 12 গৰ্বত প্রত্যেকটিতে মূল্যাংক 1

1. If L.C.M. (91, 26) = 182, then H.C.F. (91, 26) = 1

যদি L. C. M. (91, 26) = 182, তবে গ.স.উ. (91, 26) =

যদি L. C. M. (91, 26) = 182, তখন গ.স.উ. (91, 26) =

- (a) 13
- (b) 26
- (c) 7
- (d) 9

2. According to Euclid's Division Lemma, given two positive integers 'a' and 'b', there exist unique integers 'q' and 'r' such that — 1

ইউক্লিডের বিভাজন প্রয়োগিক যতে দুটি ধনাখক অথবা সংখ্যা 'a' আৰু 'b' দিয়া থাকিলে এনে দুটি অদ্বিতীয় অথবা সংখ্যা 'q' আৰু 'r' থাকিব যাতে —

ইউক্লিডের বিভাজন প্রয়োগিক যেখানে দুটি ধনাখক অথবা সংখ্যা 'a' এবং 'b' দেওয়া থাকলে একেপ দুটি অদ্বিতীয় অথবা সংখ্যা 'q' এবং 'r' থাকিব দেখানে —

- (a)  $a = bq + r$ ,  $0 < r < b$
- (b)  $a = bq + r$ ,  $0 \leq r \leq b$
- (c)  $a = bq + r$ ,  $0 \leq r < b$
- (d)  $a = bq + r$ ,  $0 < r \leq b$

3. If the graph of the polynomial  $y = f(x)$  intersects  $X$ -axis at two points, then number of zeros of  $f(x)$  is — 1

যদি  $y = f(x)$  বহুপদ রাশিটোর লেখাভালে  $X$ -অক্ষকে দুটা বিন্দুতে ছেদ করে তেন্তে  $f(x)$ -এর শূন্যাবস্থার সংখ্যা হবে —

যদি  $y = f(x)$  বহুপদ রাশিটির লেখাভিত্তি  $X$ -অক্ষকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করে তাহলে  $f(x)$ -এর শূন্যাবস্থার সংখ্যা হবে —

(a) 0

(b) 3

(c) 1

(d) 2

4. One root of a quadratic equation is 2 and sum of the two roots is 0, the equation is — 1

এটা দ্বিঘাত সমীকরণের এটা মূল 2 আৰু মূল দুটোৰ যোগফল 0, সমীকরণটো হ'ব —

একটি দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল 2 এবং মূল দুটিৰ যোগফল 0, সমীকরণটি হবে —

(a)  $x^2 + 4 = 0$

(b)  $x^2 - 4 = 0$

(c)  $4x^2 - 1 = 0$

(d)  $x^2 - 2 = 0$

5.  $\triangle ABC$  is an isosceles triangle in which  $\angle C = 90^\circ$ . If  $AC = 6\text{ cm}$ , then  $AB =$  1

$\triangle ABC$  এটা সমদিবাহু ত্রিভুজ যাতে  $\angle C = 90^\circ$ . যদি  $AC = 6$  ছেমি, তেওঁতা  $AB =$

$\triangle ABC$  একটি সমদিবাহু ত্রিভুজ যেখানে  $\angle C = 90^\circ$ . যদি  $AC = 6$  সে.মি., তাহলে  $AB =$

(a)  $6\sqrt{2} \text{ cm}$  (ছেমি.) (সে.মি.)

(b)  $6 \text{ cm}$  (ছেমি.) (সে.মি.)

(c)  $2\sqrt{6} \text{ cm}$  (ছেমি.) (সে.মি.)

(d)  $4\sqrt{2} \text{ cm}$  (ছেমি.) (সে.মি.)

6. The mid-point of the line segment joining the points  $(-6, 5)$  and  $(-2, 3)$

is  $\left(\frac{a}{3}, 4\right)$ , then  $a =$  1

$(-6, 5)$  আৰু  $(-2, 3)$  বিন্দুসংযোগী রেখাখণ্ডের মধ্যবিন্দু  $\left(\frac{a}{3}, 4\right)$  হ'লে,  $a$ -ৰ মান হ'ব =

$(-6, 5)$  এবং  $(-2, 3)$  বিন্দু সংযোগী রেখাখণ্ডের মধ্যবিন্দু  $\left(\frac{a}{3}, 4\right)$  হ'লে,  $a$ -ৰ মান হ'ব =

(a) -4

(b) -12

(c) 12

(d) -6

7.5. Value of  $\sin \theta \cos(90^\circ - \theta) + \cos \theta \sin(90^\circ - \theta)$  is —

$\sin \theta \cos(90^\circ - \theta) + \cos \theta \sin(90^\circ - \theta)$  ন মান হ'ব —

$\sin \theta \cos(90^\circ - \theta) + \cos \theta \sin(90^\circ - \theta)$  -এর মান হবে —

(a) -1

(b) 0

(c) 1

(d) 2

8. If the altitude of the sun is at  $60^\circ$ , then the height of the vertical tower that will cast a shadow of length  $30m$  is —

সূর্যৰ উচ্চতা  $60^\circ$  হ'লে, 30 মি দৈর্ঘ্যৰ ছুঁটি উৎপন্ন কৰা উলম্ব শুল্ক এটাৰ উচ্চতা হ'ব —

সূর্যৰ উচ্চতা  $60^\circ$  হ'লে, 30 মি দৈর্ঘ্যৰ ছায়া উৎপন্ন কৰা একটি উলম্ব শুল্কৰ উচ্চতা হ'বে —

(a)  $15m$  (মি.) (মি.)

(b)  $\frac{30}{\sqrt{3}} m$  (মি.) (মি.)

(c)  $15\sqrt{2} m$  (মি.) (মি.)

(d)  $30\sqrt{3} m$  (মি.) (মি.)

9. If the circumference of a circle is 44 cm, then its area is —

এটা বৃক্ষের পরিধি 44 চেমি. হলে, ইয়াৰ কালি হ'ব —

একটি বৃক্ষের পরিধি 44 সে.মি. হলে, এৰ কালি হ'ব —

(a)  $276 \text{ cm}^2$  (চেমি.<sup>2</sup>) (সে.মি.<sup>2</sup>)

(b)  $44 \text{ cm}^2$  (চেমি.<sup>2</sup>) (সে.মি.<sup>2</sup>)

(c)  $176 \text{ cm}^2$  (চেমি.<sup>2</sup>) (সে.মি.<sup>2</sup>)

(d)  $154 \text{ cm}^2$  (চেমি.<sup>2</sup>) (সে.মি.<sup>2</sup>)

10. The volumes of two spheres are in the ratio  $64 : 27$ . The ratio of their surface areas is —

দুটা গোলকৰ আয়তনৰ অনুপাত  $64 : 27$ । সিইতৰ পৃষ্ঠকালিৰ অনুপাত হ'ব —

দুটি গোলকেৰ আয়তনেৰ অনুপাত  $64 : 27$ । তাদেৱ পৃষ্ঠকালিৰ অনুপাত হ'ব —

(a)  $1 : 2$

(b)  $2 : 3$

(c)  $9 : 16$

(d)  $16 : 9$

11. The median and mode of a data are 33 and 45 respectively. Then its mean is — 1

এটা তথ্যের মধ্যম আৰু বহুলক যথাক্রমে 33 আৰু 45 হলে, মাধ্য হবে —

একটি তথ্যের মধ্যম এবং বহুলক যথাক্রমে 33 এবং 45 হলে, মাধ্য হবে —

(a) 30

(b) 33

(c) 27

(d) 35

12. A number is selected from the first 100 natural numbers. The probability that the number is divisible by 7 is — 1

প্রথম 100টি স্বাভাবিক সংখ্যার পুনা এটা সংখ্যা লোৱা হ'ল। সংখ্যাটো 7-ৰে বিভাজ্য হোৱাৰ সম্ভাবিতা হ'ল —

প্রথম 100টি স্বাভাবিক সংখ্যা থেকে একটি সংখ্যা নেওয়া হ'ল। সংখ্যাটি 7-দ্বাৰা বিভাজ্য হওয়াৰ সম্ভাবিতা হলো —

(a)  $\frac{7}{50}$

(b)  $\frac{11}{100}$

(c)  $\frac{1}{7}$

(d)  $\frac{13}{100}$

## SECTION-B

13. Prove that  $3+2\sqrt{5}$  is irrational.

2

প্রমাণ করো যে  $3+2\sqrt{5}$  অপরিমেয়।

প্রমাণ করো যে  $3+2\sqrt{5}$  অমূলদ।

14. Find the 20th and 25th terms of the AP : 3, 8, 13, 18, .....

2

সমান্তর প্রগতি 3, 8, 13, 18, .....-এর 20তম আৰু 25তম পদ দুটা উলিওৰা।

সমান্তর প্রগতি 3, 8, 13, 18, .....-এর 20তম এবং 25তম পদ দুটি বের করো।

15. Find the value of  $k$ , if the following points are collinear :

2

তলৰ বিন্দু কেইটা একবৈধীয় হলে  $k$ -ৰ মান উলিওৰা :

নিচের বিন্দুগুলি একবৈধীয় হলে  $k$ -এর মান বের করো :

$$(7, -2), (5, 1), (3, k)$$

16. Given  $\sin A = \frac{3}{4}$ , find  $\cos A, \tan A, \cot A$  and  $\sec A$ .

2

দিয়া আছে  $\sin A = \frac{3}{4}$ ,  $\cos A, \tan A, \cot A$  আৰু  $\sec A$  উলিওৰা।

দেওয়া আছে  $\sin A = \frac{3}{4}$ ,  $\cos A, \tan A, \cot A$  এবং  $\sec A$  বের করো।

17: Prove that :

2

প্ৰমাণ কৰা যে :

প্ৰমাণ কৰো যে :

$$\frac{\cos A}{1 + \sin A} + \frac{1 + \sin A}{\cos A} = 2 \sec A$$

18. Show that —

2

দেখুওৱা যে —

দেখো যে —

$$\frac{\sin 30^\circ + \tan 45^\circ - \operatorname{cosec} 60^\circ}{\sec 30^\circ + \cos 60^\circ + \cot 45^\circ} = \frac{43 - 24\sqrt{3}}{11}$$

19. A lot consists of 144 ballpens of which 20 are defective and the others are good. Nila will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives to her. What is the probability that

2

(i) She will buy it ?

(ii) She will not buy it ?

144টা বলপেন থকা এক মুঠা বলপেনত 20টা বলপেন বেয়া আছে আৰু বাকীবোৰ ভাল। নীলাই এটা কলম কিনিব যদিহে ই ভাল হয় আৰু বেয়া হ'লে নিকিনে। দোকানীয়ে যাদৃচ্ছিকভাৱে এটা কলম আনিলে আৰু তাইক দিলে। সম্ভাৱিতা কি যাতে

(i) তাই এইটো কিনে?

(ii) তাই এইটো নিকিনে?

144 টি বলপেনের একটি মুঠোয় 20 টি বলপেন খারাপ এবং অবশিষ্টগুলো ভাল। 'নীলা' একটি বলপেন কিনবে যদি সেটি ভাল হয় এবং খারাপ হলে কিনবে না। দোকানদার অনিষ্টাকৃতভাবে তাকে একটি বলপেন দিল। এর নিশ্চয়তা কি যে

- (i) সে এটি কিনবে?
- (ii) সে এটি কিনবে না?

### SECTION-C

20. Obtain all other zeros of  $2x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 6x - 2$ , if two of its zeros are  $\sqrt{2}$  and  $-\sqrt{2}$ . 3

$2x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 6x - 2$  বর্ধকী আটাইবোৰ শূন্য উলিওৱা, যদি ইয়াৰ দুটা শূন্য  $\sqrt{2}$  আৰু  $-\sqrt{2}$  হয়।

$2x^4 - 3x^3 - 3x^2 + 6x - 2$  এৰ অবশিষ্ট সবগুলো শূন্য বেৱ কৱো, যদি এৰ দুটি শূন্য  $\sqrt{2}$  এবং  $-\sqrt{2}$  হয়।

21. Solve the following pair of linear equations 3

তলৰ বৈধিক সমীকৰণযোগ সমাধান কৰা।

নিচেৰ বৈধিক সমীকৰণযোগ সমাধান কৰো।

$$4x + 9y = 5, \quad 3x - 5y = 39$$

22. Find the roots of the following equation :

তলৰ সমীকৰণটোৱ মূল নিৰ্ণয় কৰা :

নিচেৱ সমীকৰণটিৱ মূল নিৰ্ণয় কৰো :

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

23. Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them.

তলত দিয়া দিঘাত সমীকৰণটোৱ মূলৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰা। যদি বাস্তব মূল থাকে সেইবোৱ উলিওৱা।

নিম্নপ্ৰদত্ত দিঘাত সমীকৰণটিৱ মূলৰ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰো। যদি বাস্তব মূল থাকে তাহলে বেৱ কৰো।

$$2x^2 - 6x + 3 = 0$$

Or / অথবা / অথবা

Sum of the areas of two squares is  $468\text{m}^2$ . If the difference of their perimeters is  $24\text{m}$ , find the sides of the two squares.

দুটা বৰ্গৰ কলিল ঘোগফল  $468\text{ m}^2$ । যদি বৰ্গ দুটাৰ পৰিসীমাৰ পাৰ্থক্য  $24\text{ m}$  হয় তেনেহলে বৰ্গ দুটাৰ বাস্তব দীঘ উলিওৱা।

দুটি বৰ্গৰ কলিল ঘোগফল  $468\text{ m}^2$ । যদি বৰ্গ দুটিৰ পৰিসীমাৰ পাৰ্থক্য  $24\text{ m}$  হয়, তাহলে বৰ্গ দুটিৰ বাস্তব দীঘ বেৱ কৰো।

24. How many terms of the AP : 9, 17, 25, ..... must be taken so that their sum is 636 ?

3

9, 17, 25, ..... সমান্তর প্রগতিটোৰ সমষ্টি 636 পাবলে হলে কিমানটা পদ ল'ব লাগিব?

9, 17, 25, ..... সমান্তর প্রগতিটিৰ সমষ্টি 636 পেতে হলে কতগুলি পদ নিতে হবে?

Or / অথবা / অথবা

A sum of Rs. 700 is to be used to give seven cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is Rs.20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes.

এখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্রী সকলক বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা পারদৰ্শিতাৰ বাবে মুঠ 700 টকাৰ সাতটা নগদ ধনৰ পুৰস্কাৰ দিব লগা হ'ল। যদি প্রতিটো পুৰস্কাৰৰ ধন তাৰ আগবঢ়োতকৈ 20 টকা কম হয়, তেনেহ'লে প্রতিটো পুৰস্কাৰৰ মূল্য নিৰ্ণয় কৰা।

একটি বিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্রীদেৱ তাদেৱ সাৰ্বিক শিক্ষাগত পারদৰ্শিতাৰ জন্য মোট 700 টাকাৰ সাতটি নগদ পুৰস্কাৰ দিতে হবে। যদি প্রতিটি পুৰস্কাৱেৱ মূল্য তাৰ আগেৱটিৰ থকে 20 টাকা কম হয়, তাহলে প্রতিটি পুৰস্কাৱেৱ মূল্য নিৰ্ণয় কৰো।

25. Diagonals  $AC$  and  $BD$  of a trapezium  $ABCD$  with  $AB \parallel DC$  intersect each other at the point  $O$ . Using a similarity criterion for two triangles, show

that  $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$

3

$ABCD$  ট্ৰেপিজিয়ামৰ  $AB \parallel DC$  আৰু  $AC$  আৰু  $BD$  কৰ্ণ দুডালে পৰম্পৰা  $O$  বিন্দুত ছেদ কৰে।

দুটা ত্ৰিভুজৰ কোনো সাদৃশ্য চৰ্ত ব্যৱহাৰ কৰি দেখুওৱা যে  $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$ ।

$ABCD$  ট্রাপিজিয়ামের  $AB \parallel DC$  এবং  $AC$  এবং  $BD$  কর্ণ দুটি পরস্পর  $O$  বিন্দুতে ছেদ করে।

দুটি ত্রিভুজের কোনো সামুদ্র্য শর্ত ব্যবহার করে দেখাও যে  $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD}$ ।

26. Check whether  $(5, -2)$ ,  $(6, 4)$  and  $(7, -2)$  are the vertices of a triangle.  
If so, name the type of the triangle formed. 3


$(5, -2)$ ,  $(6, 4)$  আৰু  $(7, -2)$  বিন্দুকেইটা এটা ত্রিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দু হয়নো পৰীক্ষা কৰা। যদি হয়,  
তেওঘে কেনে ধৰণৰ ত্রিভুজ গঠন হ'ল তাৰ নাম লিখা।

$(5, -2)$ ,  $(6, 4)$  এবং  $(7, -2)$  বিন্দুগুলি একটি ত্রিভুজের শীৰ্ষ বিন্দু হয় কি না পৰীক্ষা কৰো।  
যদি হয়, তাহলে দেওটি কোন ধৰনৰ ত্রিভুজ হ'বে, তাৰ নাম লেখো।

27. Find the area of the shaded region in the following figure, where  $ABCD$  is a square of side 14 cm. 3

উলঙ্গ দিয়া চিত্ৰৰ আচ্ছাদিত অঞ্চলটোৱ কালি উলিওৱা, য'ত 14 হেমি. বাজ্জু  $ABCD$  এটা বৰ্গফৰ্কেত্র।

নিম্নপদ্ধতি চিত্ৰটিৰ আচ্ছাদিত অঞ্চলটিৱ কালি (ফ্রেক্ষন) বেৱ কৰো, যেখানে 14 সে.মি. বাজ্জু  $ABCD$  একটি বৰ্গফৰ্কেত্র।



## SECTION-D

28. Solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations. 4

তলৰ সমীকৰণ যোৱা হৈথিক সমীকৰণলৈ কপাস্তৰ কৰি সমাধান কৰা।

নিচের সমীকৰণদ্বয়কে হৈথিক সমীকৰণে কপাস্তৰ কৰে সমাধান কৰো।

$$\frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{3}{\sqrt{y}} = 2, \quad \frac{4}{\sqrt{x}} - \frac{9}{\sqrt{y}} = -1$$

Or / অথবা / অথবা

A fraction becomes  $\frac{9}{11}$ , if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes  $\frac{5}{6}$ . Find the fraction.

এটা ভগ্নাংশত যদি লব আৰু হৰ উভয়তে 2 যোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটো হয়  $\frac{9}{11}$ । যদি লব আৰু হৰ উভয়তে 3 যোগ কৰা হয় তেন্তে ভগ্নাংশটো হয়  $\frac{5}{6}$ । ভগ্নাংশটো উলিওৱা।

একটি ভগ্নাংশে যদি লব এবং হল উভয়ের সঙ্গে 2 যোগ করা হয়, তাহলে ভগ্নাংশটি  $\frac{9}{11}$  হয়। যদি

লব এবং হল উভয়ের সঙ্গে 3 যোগ করা হয়, তাহলে ভগ্নাংশটি হয়  $\frac{5}{6}$ । ভগ্নাংশটি বের করো।

29. In a right-angled triangle, prove that the square of hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. 4

সমকোণী ত্রিভুজত, প্রমাণ করা যে অতিভুজের বর্গ আন দুটা বাহুর বর্গের যোগফলের সমান।

প্রমাণ করো যে একটি সমকোণী ত্রিভুজে অতিভুজের দৰ্গা অন্য দুটি বাহুর বর্গের যোগফলের সমান।

Or / অথবা / অথবা

ABC is a right-angled triangle, right angled at B. AD and CE are the medians drawn from A and C respectively. If AC = 5m and  $AD = \frac{3\sqrt{5}}{2}m$ , find the length of CE. <http://www.assamboard.com>

সমকোণী ত্রিভুজ ABC ব ব সমকোণ। AD আৰু CE ত্রিমে A আৰু C ব পৰা মধ্যমা। যদি  
AC = 5 মি. আৰু  $AD = \frac{3\sqrt{5}}{2}$  মি., CE-ৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰো।

ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজের B সমকোণ। AD এবং CE হল যথাক্রমে A এবং C-ৰ থেকে  
অক্ষিত মধ্যমাদৰ্শ। যদি  $AC = 5$  মি. এবং  $AD = \frac{3\sqrt{5}}{2}$  মি. হয়, তাহলে CE-ৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰো।

30. Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 m wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are  $60^\circ$  and  $30^\circ$ , respectively. Find the height of the poles and the distances of the point from the poles.

4

এটা ৮০ মিটার বহুল রাস্তার দুয়োফালে সমান উচ্চতার দুটা খুঁটি ইটোবে সমুখরভী হৈ থিয় দি আছে। রাস্তাত খুঁটি দুটার মাঝে বিন্দু এটাৰ পৰা খুঁটি দুটাৰ শীৰ্ষৰ উঠন কোণ যথাক্রমে  $60^\circ$  আৰু  $30^\circ$ , খুঁটি দুটাৰ উচ্চতা আৰু খুঁটি দুটাৰ পৰা বিন্দুটোৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা।

একটি ৮০ মিটার চওড়া রাস্তার দুদিকে সমান উচ্চতার দুটি একটি অনাটিৰ সমুগ্রবণ্ডী হৱে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার খুঁটি দুটিৰ মধ্যেৰ একটি বিন্দুৰ থেকে খুঁটি দুটিৰ শীৰ্ষৰ উঠন কোণ যথাক্রমে  $60^\circ$  এবং  $30^\circ$ । খুঁটি দুটিৰ উচ্চতা এবং খুঁটি দুটিৰ থেকে বিন্দুটিৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰো।

31. Two tangents  $TP$  and  $TQ$  are drawn to a circle with centre  $O$  from an external point  $T$ . Prove that  $\angle PTQ = 2 \angle OPQ$ .

4

এটা বহিঃবিন্দু  $T$ ৰ পৰা  $O$  কেন্দ্ৰস্থ এটা বৃক্ষলৈ  $TP$  আৰু  $TQ$  দুড়াল স্পৰ্শক টোলা হৈল। প্ৰমাণ কৰা যে  $\angle PTQ = 2 \angle OPQ$ .


এটা বহিঃবিন্দু  $T$ -ৰ থেকে  $O$  কেন্দ্ৰস্থ একটি বৃক্ষে  $TP$  এবং  $TQ$  দুটি স্পৰ্শক টোলা হল। প্ৰমাণ কৰো যে  $\angle PTQ = 2 \angle OPQ$ .

Or / অথবা / অথবা

In the following figure,  $XY$  and  $X'Y'$  are two parallel tangents to a circle with centre  $O$  and another tangent  $AB$  with point of contact  $C$  intersecting  $XY$  at  $A$  and  $X'Y'$  at  $B$ . Prove that  $\angle AOB = 90^\circ$ .

নিচের চিত্রে  $O$  কেন্দ্রস্থ বৃক্ষে  $XY$  এবং  $X'Y'$  দুটি সমান্তরাল স্পর্শক এবং স্পর্শবিন্দু  $C$  ত আন এডাল স্পর্শক  $AB$  যে  $XY$ -কে  $A$ -ত আবং  $X'Y'$ -কে  $B$ -ত কাটে। প্রমাণ করা যে  $\angle AOB = 90^\circ$ .

বিচের চিত্রে  $O$  কেন্দ্রস্থ বৃক্ষে  $XY$  এবং  $X'Y'$  দুটি সমান্তরাল স্পর্শক এবং স্পর্শবিন্দু  $C$ -তে ধনা একটি স্পর্শক  $AB$ -টি  $XY$ -কে  $A$ -তে এবং  $X'Y'$ -কে  $B$ -তে কাটে। প্রমাণ করো যে  $\angle AOB = 90^\circ$ .



32. Construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length. Also verify the measurement by actual calculation. 4

৬ হেমি. বাদার্ক এককেন্দ্রিক বৃক্ষটোন এটা বিন্দুৰ পৰা 4 হেমি. বাদার্ক বৃক্ষলৈ এডাল স্পর্শক অংকন কৰি জোখ নোবা। লগতে প্ৰকৃত গণনাবদ্বাৰা উভ জোখ পৰীক্ষা কৰা।

৬ সে.মি. বাসাৰের এককেন্দ্ৰিক দৃঢ়টিৰ একটি বিন্দু থকে ৪ সে.মি. বাসাৰে 'বৃত্ত পৰ্যন্ত' একটি স্পৰ্শক  
একে মাপ নাও। সদৈ প্ৰকৃত গণনাৰ দ্বাৰা সেই মাপ পৱৰিষ্ঠা কৰো।

### SECTION-E

33. A toy is in the form of a cone of radius  $3.5\text{ cm}$  mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is  $15.5\text{ cm}$ . Find the total surface area of the toy. 5

এটা পুতলা একে ব্যাসার্ধযুক্ত এটা অর্ধগোলকৰ ওপৰত  $3.5$  ছে.মি. ব্যাসার্ধযুক্ত এটা শংকুলৈ গঠিত।  
পুতলাটোৰ মুঠ উচ্চতা হ'ল  $15.5$  ছে.মি। পুতলাটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি নিৰ্ণয় কৰা।

একটি পুতল একই ব্যাসার্ধযুক্ত একটি অর্ধগোলকৰ ওপৱে  $3.5$  সে.মি. ব্যাসার্ধযুক্ত একটি শংকুতে  
গঠিত। পুতলটিৰ নোট উচ্চতা  $15.5$  সে.মি। পুতলটিৰ মোট পৃষ্ঠকালি (ফ্ৰেজম্বল) নিৰ্ণয় কৰা।

**Or / অথবা / অথবা**

A cylindrical bucket,  $32\text{ cm}$  high and with radius of base  $18\text{ cm}$ , is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is  $24\text{ cm}$ , find the radius and slant height of the heap.

32 ছে.মি. ওখ আৰু  $18$  ছে.মি. ভূমিবাসাৰ্ক বিশিষ্ট এটা বেলন আকৃতিব বাল্টি বালিবে পুণীহে আছে।  
এই বাল্টিটো মাটিৰ খালী কলাত এটা শংকু আকৃতিব দল সৃষ্টি হ'ল। শংকু আকৃতিব দলটোৰ উচ্চতা  
 $24$  ছে.মি. হ'লে, শংকুটোৰ ব্যাসাৰ্ক আৰু হেলনীয়া উচ্চতা নিৰ্ণয় কৰা।

32. সে.মি. উচ্চ এবং 18 সে.মি. ভূমি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি সিলিঙ্গার আকৃতির বাল্তি বালিপূর্ণ হয়ে আছে। এই বাল্তিটি মাটিতে খালি করতে একটি শঙ্কু আকৃতির দল সৃষ্টি হল। শঙ্কু আকৃতির দলটির উচ্চতা 24 সে.মি. হলে, শঙ্কুটির ব্যাসার্ধ এবং ত্বরিক উচ্চতা নির্ণয় করো।

34. If the median of the distribution given below is 28.5, find the values of  $x$  and  $y$ . 5

Class interval :	0 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	Total
Frequency :	5	$x$	20	15	$y$	5	60

নিচের বিভাজনের মধ্যমা যদি 28.5, তেওঁতে  $x$  আৰু  $y$ -ৰ মান উলিওৱা।

ক্লেণ্টি অন্তরাল :	0 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	মুঠ
বারংবারতা :	5	$x$	20	15	$y$	5	60

নিচের বিভাজনের মধ্যমা যদি 28.5 হয়, তাহলে  $x$  এবং  $y$ -এর মান বের করো।

ক্লেণ্টি অন্তরাল :	0 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	মোট
বারংবারতা :	5	$x$	20	15	$y$	5	60

<http://www.assamboard.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

অপনে পুরানে পেপার্স ভেজে আৰু 10 রূপযো পাইঁ,

Paytm or Google Pay সে

— — — — —